



Co je Atriální Fibrilace?

AFIB je nejčastější porucha srdečního rytmu v dospělosti. V Evropské unii jí trpí 4,5 milionů lidí.

Název pochází z fibrilace (chvění se) srdečních svalů v síních. Tento stav vede k zrychlenému, zpomalenému či nepravidelnému tlukotu srdce.

AFIB je způsobena poruchou přenosu elektrických signálů, které řídí stahy srdce.

Tato porucha ohrožuje stav pacienta tím, že zhoršuje výkonnost pumpování krve srdečními svaly, a tím způsobuje tvorbu krevních sraženin v srdeční komoře.

Takto nepravidelný tlukot srdce není schopen plně nasávat a pumpovat krev, jako srdce zdravého člověka, do dolní komory srdeční.

Co jsou hlavní příčiny Atriální Fibrilace?

Riziko atriální fibrilace se zvyšuje věkem a je jím ovlivněno 1% dospělé lidské populace na celém světě. Jeden dospělý ze čtyř starších nad 55 let trpí atriální fibrilací. Atriální fibrilace je nejrozšířenější u pacientů s nemocným srdcem. U dětí se nevyskytuje.

Patologické nemoci a životní styl, které mají vliv na AFIB jsou:

- Vysoký krevní tlak
- Obezita
- Cukrovka
- Hypertyreóza
- Rakovina plic
- Nadměrná konzumace alkoholu

Jaké jsou symptomy Atriální Fibrilace?

Většina lidí s AFIB nemá žádné symptomy, zvláště pokud jejich srdce nebije moc rychle. Nejvýznamnější symptomy jsou: nadměrné bušení srdce, závratě, angina (bolest hrudi), dýchavičnost. Někteří lidé mající atriální fibrilaci tyto symptomy pravidelně ohlašují.

Včasně diagnostikovaná atriální fibrilace lékařem může zabránit mozkové mrtvici nebo srdečnímu infarktu.

Jaké jsou možnosti léčby Atriální Fibrilace?

Atriální fibrilace a důsledky s ní související, mohou být léčeny či drženy pod kontrolou, pouze pokud jsou odhaleny včas.

Až donedávna byla většina kroků převzata od terapeutů, farmakologů a z chirurgických poznatků, s cílem snížit rizika spojené s atriální fibrilací a zlepšit tak kvalitu života pacientů. Na další informace se zeptejte u Vašeho praktického lékaře.



microlife
A partner for people. For life.